


## Cómo usar las tiras de prueba de fentanilo



### Cómo usarlas

- **Si se inyecta**, primero prepare la inyección. Luego, agregue diez gotas de agua al calentador y mezcle bien.
- **Si inhala las drogas**, agregue diez gotas de agua en la bolsita vacía en que vinieron las drogas y mezcle bien.
- **Si usa pastillas**, puede triturar una en una bolsita vacía y luego tirar el polvo. Agregue diez gotas de agua dentro de la bolsita y mezcle bien.
- Sumerja la tira de fentanilo en el agua hasta las líneas ondeadas, espere quince segundos y sáquela.

### Cómo leer los resultados

- Los resultados suelen tardar uno o dos minutos en aparecer.
- **Si ve solo una línea roja en el centro de la tira reactiva, significa que sus drogas contienen fentanilo.**
- Si ve dos líneas en el centro de la tira reactiva, significa que la prueba es negativa. La segunda línea puede ser muy tenue, pero igualmente significa que es negativa.

### Cómo evitar una sobredosis

- Si obtuvo una prueba positiva es importante tener naloxona con usted y usar en presencia de alguien que no lo hace al mismo tiempo que usted. En caso de sobredosis, esa persona puede llamar al 911 y administrarle naloxona.
- Aún si obtiene una prueba negativa debe tener cuidado. Las drogas pueden igualmente estar mezcladas con fentanilo o con otra cosa que las tiras reactivas no pueden detectar. Infórmese acerca del uso más seguro de drogas.
- **¡Vaya despacio!** Empiece por usar solo un poco y espere 20 segundos para ver cuán potente es. Si siente algo extraño, tenga cuidado – considere no usarla o usar menos. Asegúrese de que alguien a su lado tenga naloxona.